

Agisce entro 24-72 ore

COMPOSIZIONE:

Acqua depurata, macrogol, acido citrico, aroma limone, potassio sorbato, sodio benzoato, sucralosio.

CONFEZIONE:

Il macrogol FLUID gusto limone è disponibile in flacone da 480 ml con misurino. Il misurino dosatore è un dispositivo medico 0373 con fabbricante Bormioli Pharma S.p.A., Corso Magenta 84, 20123 Milano (MI), Italia.

COME AGISCE:

Il macrogol è un polimero inerte idrosolubile ad alto peso molecolare che ha la capacità di legarsi all'acqua utilizzata per l'assunzione trattenendola nelle feci.

Determina una reidratazione e un ammorbidimento della massa fecale e ne facilita l'evacuazione. Accelera il transito intestinale favorendo la peristalsi. Non viene assorbito o metabolizzato nel tratto gastro-intestinale e non porta a squilibri idro-elettrolitici, se assunto con la dose indicata di liquido.

INDICAZIONI:

Trattamento sintomatico della stipsi. Favorisce la peristalsi, aiutando ad avere un'adeguata evacuazione intestinale, contrastando così la stitichezza e prevenendo la formazione di fecalomi.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE E POSOLOGIA:

Utilizzare il misurino contenuto nella confezione per dosare la soluzione orale: riempirlo in base alla posologia sotto indicata, servendosi dei riferimenti forniti dalle tacche presenti sulla superficie del misurino (prima tacca 5 ml, seconda tacca 10 ml, terza tacca 15 ml e quarta tacca 20 ml). Un misurino da 20 ml corrisponde a circa 2 cucchiari da cucina.

Adulti e bambini di età superiore ai 12 anni

• da 20 ml a 80 ml al giorno

La dose deve essere aumentata o diminuita, a seconda della risposta individuale al trattamento, in modo da consentire un'evacuazione regolare di feci morbide. La dose massima necessaria non supera normalmente gli 80 ml al giorno. La soluzione orale va assunta tal quale. Subito dopo l'assunzione del prodotto è necessario bere circa 125 ml di acqua per ogni 20 ml di soluzione assunta. Si consiglia di somministrare il prodotto al mattino nel caso si debba assumere la dose minima (20 ml al giorno). Per dosi maggiori suddividere l'assunzione tra mattino e sera.

Qualora non si dovesse notare alcun miglioramento dopo 7 giorni di trattamento, consultare il medico.

Bambini di età compresa tra 6 mesi e 12 anni

• da 6-10 Kg: 10 ml al giorno

• da 10-15 Kg: da 10 ml a 20 ml al giorno

• da 16-20 Kg: da 20 ml a 30 ml al giorno

• da 21-43 Kg: da 30 ml a 40 ml al giorno

La dose deve essere aumentata o diminuita, a seconda della risposta individuale al trattamento, in modo da consentire una evacuazione regolare di feci morbide. La dose massima necessaria non supera normalmente i 40 ml al giorno. La soluzione orale va assunta tal quale. Subito dopo l'assunzione del prodotto è necessario bere circa 60 ml di acqua per ogni 10 ml di soluzione assunta. Si consiglia di somministrare il prodotto al mattino nel caso si debba assumere la

dose minima (10 ml al giorno). Per dosi maggiori suddividere l'assunzione tra mattino e sera.

Qualora non si dovesse notare alcun miglioramento dopo 7 giorni di trattamento, si consiglia di consultare il medico.

AVVERTENZE:

Si consiglia di utilizzare il prodotto in età pediatrica dopo aver consultato il medico.

La somministrazione nei bambini deve essere effettuata sotto diretto controllo di un adulto.

Consultare il medico prima dell'uso in gravidanza e allattamento.

Non usare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata.

Il prodotto può ridurre il tempo di permanenza nell'intestino e quindi l'assorbimento di medicinali ad uso orale.

Si consiglia pertanto di consultare il medico in caso di assunzione contemporanea di medicinali ad uso orale, che devono in ogni caso essere somministrati ad una distanza di almeno 2 ore.

Il prodotto può comportare un potenziale effetto di interazione quando utilizzato con addensanti alimentari a base di amido. Il macrogol contrasta l'effetto addensante dell'amido, liquefacendo i preparati che dovrebbero invece restare densi per consentire l'assunzione da parte di persone con problemi di deglutizione.

In caso di reazioni indesiderate sospendere il trattamento e consultare il medico.

CONTROINDICAZIONI:

Non assumere SANIPEG FLUID gusto limone in caso di:

- Ipersensibilità nota verso uno o più componenti
- Ileo paralitico
- Perforazione, ostruzione o stenosi intestinale
- Gravi malattie infiammatorie dell'intestino (es. colite ulcerosa, malattia di Crohn, megacolon tossico)

L'uso dei lassativi è controindicato nel caso in cui siano presenti dolori addominali acuti o di origine sconosciuta, nausea e vomito, sanguinamento rettale di origine sconosciuta e in caso di grave stato di disidratazione.

EFFETTI INDESIDERATI:

Potrebbero verificarsi alcuni disturbi gastro-intestinali (mal di pancia, flatulenza, gonfiore addominale, nausea e incontinenza fecale). La diarrea è un effetto secondario all'assunzione di dosi eccessive di SANIPEG FLUID gusto limone ed è evitabile diminuendo la dose di assunzione.

Sono stati riportati raramente casi di reazioni da ipersensibilità (rash cutaneo) a seguito dell'utilizzo di prodotti contenenti macrogol. Nel caso, sospendere il trattamento e consultare il medico.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore.

Richiudere accuratamente il contenitore dopo l'uso.

Una volta aperto, utilizzare il prodotto entro 3 mesi.

La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

Gusto limone

Data ultima revisione: Marzo 2022
(IFU1_03/22r0_05/22)

DISPOSITIVO MEDICO  0373



I PRODOTTI SANITAS SI TROVANO IN FARMACIA



Biofarma
Via Castelliere, 2
Mereto di Tomba (UD)

Distributore:
SANITAS Farmaceutici S.r.l.
Via Emilia 168/A - 15057 Tortona (AL)

www.sanitas1931.it